



Test allergologico MY PET

Preparato per: Jessica Newhook
Proprietario di: Ernie Newhook

11 Giugno 2019

Test allergologico MY PET

Questo rapporto è basato su un'analisi di 114 allergeni comuni. Ognuno è classificato in tre modi:

1.



Ernie è risultato positivo a questo allergene (c'è stata una reazione).

2.



Ernie può reagire all'allergene ma i livelli non sono abbastanza alti per una lettura positiva.

3.



Ernie ha una reazione negativa a questo allergene (non ha risposto a questi elementi).

Analisi dettagliata



Ci sono 5 Risultati positivi

1. Broccoli

I broccoli possono essere un trattamento gustoso per i cani, ma dargliene troppi può essere un irritante digestivo e alcuni cani non sono in grado di tollerarli. I sintomi di un'intolleranza ai broccoli comprendono il leccare ossessivo delle chiazze calve, gas cronico, tosse, diarrea, tremori alla testa, orticaria, zanzare, infezioni dell'orecchio croniche, vomito e respiro sibilante. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni cutanee. Per trattare l'intolleranza ai broccoli, i corticosteroidi sono consigliati per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici possono aiutare a ridurre il prurito. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale dell'intolleranza ai broccoli, quindi alcuni veterinari potrebbero prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.



2. Cavolfiore

Il cavolfiore è un'ottima fonte di vitamine e fibre per il tuo cane. Inoltre, impedisce la diffusione delle cellule tumorali. Se il tuo cane soffre di un'intolleranza al cavolfiore, i sintomi includono diarrea, tremori alla testa, orticaria, zampe masticabili, chiazze calve, gas cronico, infezioni croniche alle orecchie, tosse, leccata ossessiva, vomito e respiro sibilante. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o eruzioni cutanee. Per il trattamento, si raccomandano corticosteroidi per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici per aiutare con il prurito. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (cavolfiore) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Anche le infezioni secondarie della pelle possono essere un effetto collaterale, quindi alcuni veterinari potrebbero prescrivere anche antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche

Test allergologico MY PET

essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.



3. Pollo

Una delle allergie alimentari più comuni tra i cani è l'allergia al pollo. Un'allergia al pollo è classificata come una reazione eccessiva a questa particolare proteina nel loro sistema immunitario. Quando il sistema immunitario entra in contatto con il pollo, lo considera invadente e risponde in modo difensivo, provocando una reazione allergica. Un'allergia al pollo può essere dovuta a un'allergia alimentare o intolleranza alimentare. Un'allergia alimentare è il modo in cui il sistema immunitario si difende da ciò che ritiene essere minaccioso. Un'intolleranza alimentare, d'altra parte, non è causata da un'istamina e non ha un coinvolgimento immunitario diretto. Un'allergia al pollo può causare sintomi come chiazze calve, gas cronico, infezioni alle orecchie croniche, diarrea da tosse, orticaria e leccata ossessiva. Può anche causare disturbi della pelle dolorosi come infezioni o eruzioni cutanee. I sintomi di intolleranza alimentare includono cambiamenti nella consistenza e nel colore delle loro feci, dolore addominale e suoni gorgoglianti dal loro sistema digestivo. Se il cane è positivo all'allergia al pollo, sono disponibili diverse opzioni di trattamento. Alcuni veterinari raccomandano trattamenti topici come corticosteroidi e antistaminici per aiutare con gonfiore e prurito. Un'allergia al pollo può anche essere trattata con una dieta di eliminazione. Attraverso questo trattamento, cambierai la dieta del tuo cane ed eliminerai tutti i prodotti che contengono pollo. Potrebbero volerci anche diverse settimane fino a quando non si vedranno dei risultati. I veterinari possono anche raccomandare probiotici o oli Omega-3 per aiutare con il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle. Inoltre, gli antibiotici possono essere prescritti per aiutare con eventuali infezioni cutanee secondarie a volte riscontrate con allergie alimentari.



4. Sedano

Il sedano è un trattamento salutare per i cani, anche se non è comune, i cani possono reagire al sedano. Se il tuo cane soffre di un'intolleranza al sedano, i sintomi includono diarrea, tremori alla testa, orticaria, zampe masticabili, chiazze calve, gas cronico, infezioni all'orecchio croniche, tosse, leccate ossessive, vomito e respiro affannoso. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o eruzioni cutanee da intolleranza al sedano. Per il trattamento, si raccomandano corticosteroidi per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici per aiutare con il prurito. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (sedano) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di un'intolleranza al sedano, pertanto alcuni veterinari potrebbero prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.



5. Uova di pollo

Le uova possono essere un'ottima fonte di nutrimento per i cani, ma possono anche essere una delle principali cause di sensibilità. Il guscio e il tuorlo hanno numerose proprietà nutrizionali che possono portare benefici ai cani. Alcuni cani non sono in grado di tollerare le uova. Le uova ei sottoprodotti delle uova si trovano in numerosi alimenti commerciali per cani. Il sintomo più comune di allergia alla uova è il prurito eccessivo. Possono anche soffrire di infezioni all'orecchio croniche,

Test allergologico MY PET

perdita di capelli, punti caldi, diarrea e orticaria. Possono anche verificarsi infezioni cutanee secondarie ed eruzioni cutanee. Se il cane ha un'intolleranza alimentare, può soffrire di stitichezza e dolore addominale. Le diete di eliminazione sono raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quelle in cui si rimuove completamente la sospetta intolleranza (uovo) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Gli Omega-3 e i probiotici vengono spesso somministrati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.

?

Ci sono 10 Risultati neutrali

1. Bok Choy

Bok Choy può essere utile per i cani in quanto aiuta a favorire la digestione, fa bene alla pelle e aiuta a combattere il cancro. Alcuni cani possono reagire al Bok Choy. Poiché il Bok Choy è una verdura cruciforme, il tuo cane può reagire anche a verdure simili come cavoli. Se un cane ha un'intolleranza al Bok Choy, i sintomi includono tremori alla testa, orticaria, zanzare, infezioni croniche dell'orecchio, leccate ossessive, chiazze calve, gas cronico, tosse, diarrea, vomito e respiro affannoso. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni cutanee. Per trattare l'intolleranza al Bok Choy, i corticosteroidi sono consigliati per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici possono aiutare a ridurre il prurito. Dal momento che il Bok Choy non è essenziale per la dieta del cane rimuoverlo potrebbe essere la migliore linea d'azione.

?

2. Cavoletti di Brussels

I cavoletti di Bruxelles possono essere un grande trattamento per i cani e hanno molti benefici nutrizionali. Alcuni cani possono soffrire di un aumento di gas da esso e alcuni non sono in grado di tollerarlo. Se un cane ha un'intolleranza ai cavoletti di Bruxelles, i sintomi includono il leccare ossessivo delle chiazze calve, gas cronico, tosse, diarrea, tremori alla testa, orticaria, morsi di zampa, infezioni alle orecchie croniche, vomito e respiro sibilante. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni cutanee. Per trattare l'intolleranza ai cavolini di Bruxelles, i corticosteroidi sono consigliati per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici possono aiutare con il prurito. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (cavoletti di Bruxelles) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di una intolleranza al germoglio di Bruxelles, quindi alcuni veterinari possono prescrivere anche antibiotici. Altri supplementi - come probiotici e oli Omega-3 - possono anche essere raccomandati per aiutare a proteggere la loro pelle e sostenere il loro sistema immunitario.

?

3. Cavolo

Il cavolo può essere utile per i cani in quanto aiuta a favorire la digestione, fa bene alla pelle e aiuta a combattere il cancro. Alcuni cani possono reagire ai cavoli. Poiché il cavolo è una verdura cruciforme, il tuo cane può reagire anche a verdure simili come il kale o altre verdure. Se un cane ha un'intolleranza al cavolo, i sintomi includono lo scuotere la testa, orticaria, mordere le zampe, infezioni alle orecchie croniche, leccate ossessive chiazze calve, gas cronico, tosse, diarrea, vomito e respiro sibilante. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni cutanee. Per trattare un'intolleranza al cavolo, si raccomandano corticosteroidi per aiutare a ridurre

Test allergologico MY PET

il gonfiore e gli antistaminici possono aiutare a ridurre il prurito. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (cavolo) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di un'intolleranza al cavolo e anche i veterinari possono prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.

?

4. Kale - Cavolo verde

Alcuni cani amano il cavolo verde ma altri cani sono allergici ad esso. Se il tuo cane soffre di intolleranza alla caviglia, i sintomi includono diarrea, tremori alla testa, orticaria, zampe di pungente, chiazze calve, gas cronico, infezioni alle orecchie croniche, tosse, leccata ossessiva, vomito e respiro sibilante. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o eruzioni cutanee da intolleranza al cavolo. Dal momento che il cavolo è una verdura crucifera, il tuo cane può reagire anche a verdure simili come cavoli o verdure. Per il trattamento, si raccomandano corticosteroidi per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici per aiutare con il prurito. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (kale) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di un'intolleranza di cavolo, quindi alcuni veterinari potrebbero anche prescrivere antibiotici. Altri supplementi - come probiotici e oli Omega-3 - possono anche essere raccomandati per aiutare a proteggere la loro pelle e sostenere il loro sistema immunitario.

?

5. Lecitina

La lecitina è un ingrediente un po' comune aggiunto a un certo numero di alimenti per cani. È usato generalmente come emulsionante ma è anche una buona fonte di colina che viene utilizzata per promuovere cellule sane. La lecitina viene anche estratta da un certo numero di fonti, tra cui latte, girasole di tuorlo d'uovo e più comunemente soia, quindi se il cane sta reagendo a una di queste potrebbe essere la lecitina a cui stanno reagendo. Se il tuo cane soffre di un'intolleranza alla lecitina, i sintomi possono includere vomito, diarrea, gonfiore, diminuzione dell'appetito ed eruzioni cutanee. È importante leggere attentamente le etichette degli alimenti per cani per individuare eventuali lecitine se il cane sta reagendo ad esso. Per il trattamento, le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione si verificano quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (fonti correlate alla lecitina e alla lecitina) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi.

?

6. Olio di Canola

Sebbene sia usato in molti alimenti per cani e leccornie, alcuni cani possono essere reattivi all'olio di canola. Se un cane soffre di una sensibilità all'olio di canola, i sintomi includono infiammazione e dolore cronico all'orecchio, tosse, orticaria, prurito, naso che cola, morso della zampa, nausea e vomito. Alcuni cani possono soffrire di dolori addominali o stitichezza se soffrono di intolleranza all'olio di colza. Per il gonfiore e il prurito, i veterinari possono prescrivere pomate o farmaci come antistaminici e corticosteroidi. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (olio di canola) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Se il cane soffre di una infezione cutanea secondaria, possono essere prescritti antibiotici. I probiotici e gli omega-3 sono talvolta prescritti anche per aiutare a sostenere il sistema immunitario e proteggere la pelle.

?

7. Olio di girasole

L'olio di girasole è un acido grasso omega-6 ed è essenziale per la salute del tuo cane. Tuttavia, alcuni cani possono essere intolleranti all'olio di girasole. Se un cane soffre di una sensibilità all'olio di girasole, i sintomi includono tremori alla testa, gas cronico, infiammazione e dolore all'orecchio cronico, tosse, orticaria, prurito, naso che cola, morsicamento della zampa, nausea e vomito. Alcuni cani possono avere dolore addominale o stitichezza se soffrono di un'intolleranza all'olio di girasole. Per il gonfiore e il prurito, i veterinari possono prescrivere pomate o farmaci come antistaminici o corticosteroidi. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (olio di girasole) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi. Se il cane soffre di una infezione cutanea secondaria, possono essere prescritti antibiotici. I probiotici e gli omega-3 sono talvolta prescritti anche per aiutare a sostenere il sistema immunitario e proteggere la pelle.

?

8. Olio vegetale

Molte persone alimentano il cane di olio vegetale a causa dei benefici per la salute che può fornire. Può provocare il prurito dei cani ma ha molti benefici nutrizionali tra cui acidi grassi omega-6. Sebbene un cane possa tollerare l'olio vegetale, troppo può procurarne un mal di stomaco. Inoltre, se il cane sta reagendo all'olio vegetale, può essere difficile determinare l'ingrediente specifico nell'olio a cui sta reagendo. I sintomi dei cani che reagiscono all'olio vegetale sono disturbi di stomaco, vomito e diarrea. I sintomi delle reazioni di olio vegetale possono includere anche prurito e pelle sensibile, gas e mal di stomaco. Se il tuo cane soffre di una reazione all'olio vegetale, si consiglia di interrompere l'alimentazione. I metodi di trattamento temporaneo comprendono creme topiche come antistaminici o corticosteroidi.



9. Rape

Le rape possono essere trovate come ingrediente in alcuni alimenti per animali domestici, ma alcuni cani possono essere sensibili alla verdura. I sintomi di un'intolleranza alla rapa comprendono tosse, diarrea, tremori della testa, orticaria, zampe mordenti, lividi ossessivi di calvizie, gas cronico, infezioni all'orecchio croniche, vomito e respiro sibilante. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni cutanee. Per trattare un'intolleranza alla rapa, i corticosteroidi sono consigliati per aiutare a ridurre il gonfiore e gli antistaminici possono aiutare con il prurito. Se il tuo cane è sensibile alle rape, puoi smettere di darle da mangiare. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di un'intolleranza alla rapa e alcuni veterinari possono anche prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.



10. Verdure verdi

Le verdure verdi possono essere utili ai cani poiché aiutano la digestione e sono una delle verdure più sane. Sebbene non comune, alcuni cani possono reagire ai cavoli. Dal momento che i cavoli sono verdure crucifere, il tuo cane può reagire anche a verdure simili come cavoli o cavoli. Se un cane ha un'intolleranza al cavolo verde, i sintomi possono includere gas cronico, tosse, diarrea, vomito e respiro sibilante. Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di questa intolleranza e anche i veterinari possono prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle. Poiché i cavoli verdi non sono una parte essenziale della dieta, eliminarli del tutto può essere l'opzione migliore.



Ci sono 99 Risultati negativi

Acari della polvere
Ananas
Arancia
Barbabietola rossa
Bufalo/Bisonte
Carota
Cetriolo
Crostacei
Fagioli di Lima
Fagioli rossi
Farina d'avena
Formiche
Funghi

Agnello
Anatra
Avena
Barbabietole
Burro di arachidi
Ceci
Coniglio
Crusca di riso
Fagioli marini
Fagiolini verdi
Farina di pesce
Fragole
Gelatina

Alghe
Anguria
Banana
Brodo di pesce
Cagliata di fagioli
Cereali
Cozza da labbre verdi
Erba
Fagioli Pinto
Falene
Formaggio
Frumento
Glicole Propilenico Etere

Test allergologico MY PET

Glucosamina	Grano saraceno	Igname
Ippoglosso	Lampone	Latticini
Limone	Limonene	Maiale
Mais	Mango	Manzo
Mela	Melassa	Merluzzo
Mirtilli rossi	Mirtillo	More
Mosca domestica	Olio di cocco	Olio di fegato di merluzzo
Olio di mandorle	Olio di Oliva	Olio di semi di cotone
Olio di semi di lino	Orzo	Patate
Patate dolci	Pera	Pesche
Piselli verdi	Piume	Polline
Pomodori	Pulci	Riso bianco
Riso del birrifico	Riso integrale	Salmone
Sardine	Scarafaggio	Sciroppo di mais
Sgombro	Siero di latte	Soia
Sorgo	Spinaci	Tabacco
Tacchino	Tapioca	Tempeh
Tonno	Uova di anatra	Yogurt
Yucca	Zanzare	Zenzero
Zucca	Zucca 'Squash'	Zucchini

Allergy Test My Pet è un marchio di proprietà di Canadian Dog Group Ltd. noto come Allergy Test My Pet.

Allergy Test My Pet è progettato per testare le sensibilità del proprio cane, non le allergie vere che sono immediate e possono avere gravi conseguenze. I test di sensibilità indicano una risposta ritardata da parte degli anticorpi del proprio cane all'allergene da testare.

Questo test è stato progettato per aiutare ad apprendere le sensibilità che il proprio cane potrebbe avere, in modo da poter comprendere meglio ciò che il proprio animale domestico potrebbe non essere in grado di tollerare. Ci sono un certo numero di opzioni disponibili per affrontare queste sensibilità. Consigliamo di discuterne con il proprio veterinario per trovare la soluzione migliore. Questo può includere l'introduzione di una nuova dieta per il proprio cane, eliminando determinati alimenti e farmaci.

Questo test non ha lo scopo di offrire consulenza medica e se il proprio cane sta mostrando sintomi consigliamo di chiedere il parere di un professionista. Speriamo che questo test metterà il proprio cane sulla strada giusta per il benessere.